

**1. Два промені є доповняльними, якщо:**

- А) вони мають спільний початок
- Б) їх об'єднанням є пряма і вони мають спільний початок
- В) вони належать одній прямій
- Г) їх об'єднанням є пряма

**2. Яке з наступних тверджень є неправильним?**

- А) вертикальні кути рівні
- Б) вертикальні кути пропорційні
- В) якщо кути рівні, то вони вертикальні
- Г) сторони вертикальних кутів утворюють дві пари доповняльних променів

**3. Розв'яжіть рівняння:  $\frac{3x - 1}{6} - \frac{x}{3} = \frac{5 - 2x}{9}$**

- А) 0
- Б)  $1\frac{6}{7}$
- В) 1
- Г)  $\frac{13}{7}$

**4. Який з виразів кратний 61?**

- А)  $5 \cdot 2^{962} - 3 \cdot 2^{961} + 2^{960}$
- Б)  $6^5 - 18^3$
- В)  $17^3 + 17^2 - 17$
- Г)  $25^4 - 125^2$

**5. Яке з наступних тверджень є неправильним?**

- А) перпендикулярні відрізки завжди мають спільну точку
- Б) перпендикулярні промені завжди мають спільну точку
- В) перпендикулярні прямі завжди мають спільну точку
- Г) перпендикулярні промінь і відрізок завжди мають спільну точку

**6. При якому значенні а рівняння**

$$(x+2)(x-4) - (x-2)(x+4) = ax \text{ має безліч коренів?}$$

- А) 0
- Б) -1
- В) -3
- Г) -4

**7. Скільки розв'язків має рівняння  $x^2 - 8x + 18 = 0$ ?**

- А) один
- Б) два
- В) жодного
- Г) безліч

**8. Знайдіть значення виразу  $\frac{39^2 - 33^2}{24^2 - 12^2}$**

- А) 0
- Б) -1
- В) 1
- Г) 2

**9. Який із виразів ділиться націло на 7?**

- А)  $(2n+5)^2 - (2n-3)^2$
- Б)  $(4n+19)^2 - (3n-5)^2$
- В)  $(n^2 - 3n + 1)^2 - n^4 + 3n + 5$
- Г)  $16n^4 - (4n^2 - 2n - 1)^2 + 8n + 1$

**10. Обчисліть значення виразу  $1,66^2 + 1,66 \cdot 4,68 + 2,34^2$**

- А) 1
- Б) 0
- В) 16
- Г) -5

**11. При якому значенні а рівняння**

**$(3x - 1)(x + a) = (3x - 2)(x + 1)$  не має коренів?**

- А) -1
- Б)  $\frac{1}{2}$
- В)  $\frac{5}{6}$
- Г)  $\frac{2}{3}$

**12. Дано три точки, які не лежать на одній прямій. Скільки точок містить геометричне місце точок, рівновіддалених від даних?**

- А) дві
- Б) одну
- В) безліч
- Г) жодної

**13. Центр описаного кола трикутника – це точка перетину:**

- А) висот
- Б) медіан
- В) серединних перпендикулярів його сторін
- Г) бісектрис

- 14. На скільки значення виразу**  
 $27a^3 + 4 - (9a^2 - 3a + 1) \cdot (3a + 1)$  менше від числа 10?
- (○A) на 1      (○B) на 5  
(○C) на 7      (○D) на 10
- 15. Знайдіть значення виразу:**  
 $1,87^2 - 1,13^2 + 6 \cdot 1,13$
- (○A) 0      (○B) -11      (○C) 9      (○D) 11
- 16. Різниця куба натурального числа і самого цього числа ділиться націло на**
- (○A) 5      (○B) 6      (○C) 7      (○D) 11
- 17. Сплавили два злитки. Маса одного з них становила 105 г, і він містив 40% міді. Маса другого злитка становила 75 г. Знайдіть відсотковий вміст міді в другому злитку, якщо отриманий сплав містив 50% міді.**
- (○A) 50%      (○B) 53%      (○C) 64%      (○D) 71%
- 18. Розв'яжіть систему рівнянь:**  $\begin{cases} 3x + 7y = 1 \\ 6y - 5x = 16 \end{cases}$
- (○A) (-2; 1)      (○B) (2; -1)  
(○C) (-1; 1)      (○D) (-3; 2)
- 19. Половину цукерок розфасували в мішечки по 500 г у кожний, а другу половину - у менші мішечки по 300 г у кожний. Усього вийшло 32 мішечки. Скільки було цукерок?**
- (○A) 10 кг      (○B) 12 кг  
(○C) 14 кг      (○D) 16 кг
- 20. До деякого двоцифрового числа ліворуч і праворуч дописали цифру 1. У результаті отримали число, яке в 21 раз більше за дане. Знайдіть дане двоцифрове число.**
- (○A) 61      (○B) 71      (○C) 81      (○D) 91
- 21. Сума добутку трьох послідовних натуральних чисел і середнього з цих чисел дорівнює**
- (○A) квадрату середнього числа  
(○B) сумі крайніх чисел  
(○C) добутку крайніх чисел  
(○D) кубу середнього числа
- 22. Сума двох чисел дорівнює 28, а різниця їх квадратів становить 112. Знайдіть ці числа.**
- (○A) 19; 9      (○B) 17; 11  
(○C) 16; 12      (○D) 15; 13

- 23. Через точку  $M$  проведено дотичні  $MK$  і  $ME$  до кола з центром у точці  $O$ , де  $K$  і  $E$ -точки дотику,  $\angle OMK = 30^\circ$ ,  $MK = 6$  см. Знайдіть довжину хорди  $KE$ .**
- (○A) 2 см      (○B) 4 см  
(○C) 6 см      (○D) 8 см
- 24. Знайдіть кут між прямими, на яких лежать дві медіані рівностороннього трикутника.**
- (○A)  $45^\circ$       (○B)  $50^\circ$       (○C)  $60^\circ$       (○D)  $65^\circ$
- 25. У колі проведено хорди  $AB$  і  $BC$ , кожна з яких дорівнює радіусу кола. Знайдіть  $\angle ABC$ .**
- (○A)  $70^\circ$       (○B)  $80^\circ$   
(○C)  $90^\circ$       (○D)  $120^\circ$
- 26. На гіпотенузі  $AB$  прямокутного рівнобедреного трикутника  $ABC$  позначили точки  $M$  і  $K$  (точка  $M$  лежить між точками  $B$  і  $K$ ) так, що  $AC = AM$  і  $BC = BK$ . Знайдіть  $\angle MCK$ .**
- (○A)  $45^\circ$       (○B)  $50^\circ$       (○C)  $60^\circ$       (○D)  $65^\circ$
- 27. Висота рівнобедреного трикутника, проведена до основи, у 2 рази менша від цієї основи. Знайдіть кути даного трикутника.**
- (○A)  $50^\circ, 50^\circ, 80^\circ$       (○B)  $60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$   
(○C)  $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$       (○D)  $55^\circ, 55^\circ, 70^\circ$
- 28. Знайдіть периметр трикутника  $ABC$ , якщо  $AB + BC = 27$  см,  $AB + AC = 28$  см,  $BC + AC = 29$  см.**
- (○A) 21 см      (○B) 33 см  
(○C) 42 см      (○D) 55 см
- 29. Градусні міри суміжних кутів  $ABC$  і  $CBD$  відносяться, як 5 : 4. Знайдіть кут між бісектрисами кутів  $ABC$  і  $ABD$ ?**
- (○A)  $30^\circ$       (○B)  $40^\circ$   
(○C)  $100^\circ$       (○D)  $140^\circ$
- 30. Відрізок, довжина якого дорівнює  $a$ , поділили на п'ять рівних відрізків. Знайдіть відстань між серединами крайніх відрізків.**
- (○A)  $2a$       (○B)  $\frac{3a}{2}$   
(○C)  $\frac{5a}{6}$       (○D)  $\frac{4a}{5}$